

Ptasia grypa jest bardzo zaraźliwą chorobą – jej najbardziej niebezpieczną formę wywołuje wirus grypy ptasiej H5N1. Wirus ten jest groźny dla ptactwa, ale w sumie mało zakaźny, jeśli chodzi o ludzi. Od 2003 r. zachorowało niewiele ponad 120 osób (w krajach Azji Południowo-Wschodniej) i były to osoby mające bezpośredni kontakt z żywym lub zabitym chorym ptactwem. Nie stwierdzono natomiast przechodzenia wirusa z człowieka na człowieka – choć takie zagrożenie istnieje, ponieważ wirus ma zdolności do tzw. mutacji.

Wirus ptasiej grypy w zależności od warunków może przeżyć:

- w środowisku kurnika – do 5 tygodni,
- w kale do 35 dni w temp. 4°C i 7 dni w temp. 20°C,
- w wodzie (stawy, jeziora) w temp. 22°C przez 4 dni, w temp. 0°C 30 dni,
- w tuszkach drobiu w temp. pokojowej – kilka dni, w temp. lodówki – nawet do 30 dni.
- może utrzymywać się w produktach mięsnych, ale niszczy go obróbka cieplna.

Wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

Rozpoznawanie choroby:

Do głównych objawów klinicznych u drobiu należą:

- depresję, objawy nerwowe,
- gwałtowny spadek (utrata) produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek,
- silne łzawienie, kichanie,
- duszność,
- biegunka.



Śmiertelność wśród drobiu może dochodzić nawet do 100%!

W związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt spowodowanego możliwością wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju **obowiązuje zakaz** organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw; sprzedaży na targowiskach tego ptactwa, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda w tej sprawie zgodę. Dopuszcza się **utrzymywanie** tych zwierząt **na otwartej przestrzeni** jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Głównym źródłem zagrożenia są ptaki wolnożyjące, które są zarazem bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy.

DLATEGO:

Należy pamiętać, aby zabezpieczyć pojemniki z karmą i wodą przed dostępem do nich ptaków dzikich. Ponadto pojenie lub czyszczenie pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (zbiorniki wodne, rzeki) może też być przyczyną zakażenia.

Jak się zabezpieczyć przed chorobą?

- Najlepiej unikać kontaktu z wszelkim ptactwem nie zależnie od stanu jego zdrowia - należy unikać miejsc, gdzie występują duże skupiska ptaków - ferm, kurników, stad gołębi na placach.
- Nie trzeba rezygnować z mięsa drobiowego i jajek. **Wirus ptasiej grypy ginie w obróbce termicznej w temperaturze powyżej 70°C.**
- Szczepienia ochronne przeciwko grypie nie zabezpieczą przed zachorowaniem na ptasią grypą, ale mogą złagodzić jej przebieg.

Wirus ptasiej grypy **u ludzi** powoduje zakażenie o wiele cięższe od "klasycznej" ludzkiej grypy. W niewielu przypadkach zakażenia zaobserwowano następujący przebieg choroby: **gorączka, ból gardła, kaszel**. Następnie mogą wystąpić stany zapalne płuc, a nawet **śmierć**.

Wirus ptasiej grypy może rozprzestrzeniać się w powietrzu, a także poprzez nawozy. Źródłem potencjalnego zakażenia oprócz wody, może być także skażona pasza oraz nieodkazona odzież robocza i sprzęt oraz zanieczyszczone środki transportu.

Główną drogą zakażenia jest kontakt z wydzielinami i wydaliniami zarażonych ptaków. Wirus przenosi się również na butach, a także przez gryzonie do innych farm – zwiększając w ten sposób rozmiar zagrożenia.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt należy obowiązkowo:

1. Niezwłocznie zawiadomić o tym organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (prywatnie praktykujący lekarze weterynarii) lub wójta (burmistrza).
2. Pozostawić zwierzęta w miejscu ich przebywania i nie wprowadzać tam innych zwierząt.
3. Uniemożliwić osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie / chorobę lub zwłoki zwierzęce.
4. Wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych.
5. Udostępnić organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta i zwłoki zwierzęce do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielić pomocy przy ich wykonaniu.
6. Udzielić organom Pomocy Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podać informacje, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

INFORMACJA

KAMIENNA GÓRA
LUTY 2006 r.



O swoich podejrzeniach poinformuj którąś
z poniższych instytucji:



Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Armii Ludowej 7
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645 0 210

**Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego**
Komenda Powiatowa PSP
ul. Słoneczna 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 998

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny**
ul. Sienkiewicza 5
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645 0 140

Urząd Miasta Kamienna Góra
Pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 645 5 110

Urząd Gminy Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 744 4 032

Urząd Miasta i Gminy Lubawka
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka
tel. (075) 741 1 588

Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
tel. (075) 741 0 208